

	<i>Muscari botryoides</i> x <i>M. neglectum</i>	<i>Muscari botryoides</i> subsp. <i>botryoides</i>	<i>Muscari botryoides</i> subsp. <i>longifolium</i>	<i>Muscari neglectum</i>
<b>Bulbo</b>	Ovato 1-2 x 2-3 cm non prolifero	Ovato-piriforme 1-2 cm x 2-3 cm non prolifero o raramente tale	Ovato-piriforme, 1-2 cm x 2-3 cm, a volte prolifero	Ovoide 1-2 x 2-3 cm prolifero con molti bulbilli
<b>Scapo</b>	Esile, alto 15-20(-25) cm	Robusto alto 10-25(-40) cm	Robusto alto 10-35(-40) cm	Robusto alto 15-30(-35) cm
<b>Foglie</b>	In numero di 3-4(-5), larghe 2-3 mm, a comparsa tardo autunnale	Poche 2-3, larghe 3-10 mm, non a comparsa autunnale	In numero di 2-4(-5), larghe 4-10(-15) mm, a comparsa autunnale	Più di 5, larghe 4-6 mm, a comparsa autunnale
	Foglie da lineari a sub-spatolate appena più lunghe dello scapo, patenti, con apice lungamente disseccato all'antesi, lungo sino ad un terzo della foglia.	Foglie più brevi dello scapo o rr sub-eguali ad esso, carenate e strette alla base, lanceolato-spatolate e contratte bruscamente all'apice ad angolo ottuso, erette o sub-erette. Apice fogliare cucullato.	Foglie molto lunghe, anche 3-4(-5) volte lo scapo, lineari o lineari-lanceolate e sub-erette, con apice marcescente all'antesi.	Foglie giunchiformi e scanalate, striate sul dorso, patenti e marcescenti all'apice all'antesi, lunghe almeno il doppio dello scapo o assai raramente sub-eguali ad esso
<b>Infiorescenza</b>	Lassa con 10-20(-25) fiori	Lassa con 20-30(-35) fiori	Lassa con 20-40 fiori	Compatta con 20-40(-50) fiori
<b>Fiori</b>	Di colore blu, inodori e non pruinosi	Di colore blu o ceruleo, inodori o poco odorosi, non pruinosi	Di colore blu-violetto chiaro, inodori o poco odorosi, raramente pruinosi	Di colore viola, blu scuro pruinosi e profumati
	Perigonio intero globoso-oblungo lungo 3-5 mm	Perigonio intero ovato-globoso lungo 2-4 mm	Perigonio intero urceolato lungo 4-6 mm	Perigonio intero ovato-oblungo lungo 2-6 mm
<b>Frutti</b>	Capsula obovoide di 4 x 5 mm	Capsula di 4-6 x 4-6 mm loculicida, tricarpellare, trigona dal contorno suborbicolare, con apice retuso	Capsula ovoide di 6-10 mm x 8-12 mm, tricarpellare.	Capsula di 7-10 x 8-10 mm, da ovoide a obovoide, da smarginata a apiculata, con 3 valve sub-orbicolari tanto larghe che lunghe.
<b>Semi</b>	Semi ovoidi lunghi circa 2-2,5 mm, nerastri, rugosi.	Semi ovoidali lunghi fino a 2,5 mm, neri, rugosi.	Semi ovoidali lunghi fino a 3 mm, nerastri, rugosi.	Semi subglobosi o obovoidi, glabri, finemente striati, marrone-nerastri, lunghi circa 2,2-2,8 mm.
<b>Antesi</b>	Metà marzo	Primi di marzo	Metà febbraio	Fine marzo-inizio aprile
<b>Numero cromosomico</b>	2n=36 (TORNADORE & MARCUCCI, 2005)	2n=36 (GARBARI, 1984; SOMLYAY <i>et al.</i> , 2006)	2n=36 (FRATTINI <i>et al.</i> , 1996)	2n=36, 45, 54, 63, 72 (GARBARI, 1984); 2n=27 + 0-5 B (TORNADORE & MARCUCCI, 2005)